

**Bijlage 1 Kalium suppletie behorende bij protocol zoutbelastingstest iZBT**

| <b>Start Kalium suppletie avond voorafgaand aan uitvoer iZBT</b> |   |
|--|---|
| K <sup>+</sup> < 2,5   | Overleg afdelingsarts   |
| K <sup>+</sup> 2.5- 3.0  | Geef 40 mmol kaliumchloride drank om 17.00u, 22.00u en 2.00u (naast de reeds voorgeschreven kaliumsuppletie)                |
| K <sup>+</sup> 3.1- 3.6  | Geef 20 mmol kaliumchloride drank om 17.00u, 22.00u en 2.00u (naast de reeds voorgeschreven kaliumsuppletie, thuisdosering) |
| K <sup>+</sup> 3,7 of hoger                                      | Neem de reeds voorgeschreven kaliumsuppletie (thuisdosering)  |
| <b>Start Kalium suppletie in de uren voorafgaand aan iZBT</b>    |   |
| K <sup>+</sup> <3.0  | Geef 40 mmol kaliumdrank om 6.30u en 7.30u. Gebruik daarnaast de reeds voorgeschreven kaliumsuppletie (thuisdosering).      |
| K <sup>+</sup> 3.0-3.6   | Geef 40 mmol kaliumdrank om 6.30u. Gebruik daarnaast de reeds voorgeschreven kaliumsuppletie (thuisdosering).               |
| K <sup>+</sup> 3,7 of hoger                                      | Neem de reeds voorgeschreven kaliumsuppletie (thuisdosering)  |
| (K <sup>+</sup> in mmol/L; de kaliumdrank bevat 1 mmol/mL)       |   |